

2-Substituted aniline as simple scaffold for LuxR-regulated QS modulation

Si-Zhe Li,¹ Julien Wawrzyniak,² Yves Queneau,^{* 1} and Laurent Soulerè^{*1}



¹ Univ Lyon, INSA Lyon, Université Lyon 1, CPE Lyon, UMR 5246, CNRS, ICBMS, Institut de Chimie et de Biochimie Moléculaires et Supramoléculaires, Bât. J. Verne, 20 avenue A. Einstein, F-69621 Villeurbanne, France.



² Univ Lyon, INSA Lyon, Université Lyon 1, UMR 5240, CNRS, MAP, Microbiologie, Adaptation, Pathogénie, F-69621, Villeurbanne Cedex, France.



Supplementary data



* Corresponding authors at: ICBMS, Chimie Organique et Bioorganique, INSA-Lyon, 20 avenue Albert Einstein, Villeurbanne F-69621, France. Fax: +33 4 72 43 88 96.
E-mail address: Yves Queneau@insa-lyon.fr and laurent.soulerè@insa-lyon.fr



¹H NMR Spectra


















compound (11)
300 MHz, CDCl₃





compound (12)
300 MHz, CDCl₃







compound (13)
300 MHz, CDCl₃



compound (14)
300 MHz, CDCl₃





compound (15)
300 MHz, CDCl₃

